AGENCIA ITALIANA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

iila
Organización internacional ítalo-latino americana

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

Proyecto «Revitalización de la cadena de cacao de calidad en Centroamérica y El Caribe»

AID 11082

FUNDALACHUA

COAGRICSAL
COOPERATIVA DESDE 1995

CENTA
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL "ENRIQUE ÁLVAREZ CÓRDOVA"

GOBIERNO DE EL SALVADOR

Proyecto "Revitalización de la cadena de cacao de calidad en Centroamérica y El Caribe"

AID 11082

© Publicación IILA 2021
IILA – Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana
Secretaría Socioeconómica
Via Giovanni Paisiello, 24 – 00198 Roma (Italia)
Tel. 0039 06684921 – fax 0039 06 6872834
e-mail info@iila.org
www.iila.org

CRÉDITOS

Secretaría Socioeconómica - Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA).

Proyecto "Revitalización de la cadena de cacao de calidad en Centroamérica y El Caribe"AID 11082.

Edición técnica: Marco Fernando Guilcapi Luna.
Fotografías: Marco Fernando Guilcapi Luna y Sin Retorno Studio.
Fecha de elaboración: Año 2021.

PREFACIO

En el marco del proyecto “Revitalización de la cadena de cacao de calidad en Centroamérica y El Caribe” AID 11082, ejecutado por la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA) con fondos de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS), se elabora en colaboración con CENTA, COAGRICSAL, FUNDALACHUA, el presente manual que recopila una serie de buenas prácticas agrícolas como punto de referencia para los productores de cacao a pequeña escala beneficiarios del proyecto, para mejorar la productividad y la calidad del cacao en sus plantaciones.

ÍNDICE

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.....3

PLANIFICACIÓN DE FINCA.....4

CULTIVO DE CACAO.....6

MANEJO DE LA FERTILIZACIÓN.....10

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES..14

RIEGO.....19

BIBLIOGRAFÍA..... 21

ANEXOS.....22

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

Se conoce con el término de "buena práctica" a toda aquella actividad agrícola que busca el mejoramiento del proceso productivo, tomando en cuenta principalmente tres componentes: humano, ambiental y económico.

La FAO menciona que las buenas prácticas agrícolas "Consisten en la aplicación del conocimiento disponible a la utilización sostenible de los recursos naturales básicos para la producción, en forma benévola, de productos agrícolas alimentarios y no alimentarios inocuos y saludables, a la vez que se procuran la viabilidad económica y la estabilidad social" (FAO, 2004).

En el contexto agrícola mundial, las buenas prácticas agrícolas tienen que ver con la búsqueda de información por parte de los consumidores, ya sea de origen, composición, calidad y beneficios o perjuicios intrínsecos a la producción del alimento a consumir.

Fotografía 1. Frutos del cacao.
Herbert Betancourt, Finca Chiquihuat.

La presente es una recopilación de buenas prácticas aplicadas al cultivo de cacao entorno al desarrollo del Proyecto "Revitalización de la cadena de cacao de calidad en Centroamérica y El Caribe" AID 11082.

PLANIFICACIÓN DE FINCA

Antes de empezar cualquier actividad agrícola, en especial aquella que tiene que ver con la producción de un "commodity"[1] como el cacao, el productor interesado debe responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué material debo sembrar?
- ¿Dónde debo sembrar?
- ¿Cómo debo sembrar?
- ¿En qué fecha/temporada debo sembrar?
- ¿Qué necesito para sembrar?

Estas preguntas comprenden una base para la planificación de la finca que incluya como cultivo al cacao.

En función del tamaño de la finca y área disponible se podrá determinar la ubicación del cultivo, buscando principalmente zonas que presten las condiciones óptimas para el cultivo de cacao.

Preferiblemente serán: tierras fértiles planas o sin fuertes pendientes, de fácil acceso al agua y con disponibilidad de luz solar. Otros factores de conocer serán la altitud de la finca, la humedad relativa y la predominancia de vientos.

1 Bien genérico que generalmente no represente ninguna transformación (FAO, 2004).

Se recomienda determinar el sitio adecuado pensando, no solo en la fase productiva, sino también en las actividades siguientes, como la implementación de vivero, el cuidado del cultivo y la cosecha y postcosecha.

La planificación, en la medida de lo posible, debe incluir un análisis de su entorno, es decir, que el cultivo en la finca no altere las actividades normales de los demás.



Ilustración 1. Ilustración de la ubicación de una finca de cacao en relación con su entorno. (Sin Retorno Studio).

Se recomienda que el productor identifique con un dibujo la ubicación del cultivo de cacao en su finca y analice así las posibles interacciones entre el cultivo y su entorno.

CULTIVO DE CACAO

El cacao es un cultivo tropical que se desarrolla en las latitudes comprendidas entre los 10°N y 10°S del Ecuador. Está ampliamente extendido en África, Asia, Oceanía y América en plantaciones destinadas a producir esencialmente sus granos o almendras. El cacao debe ser cultivado en zonas con altitudes por debajo de los 1,300 msnm, en climas cálidos con una precipitación promedio de 1,150mm a 2,500mm y un rango de temperatura ideal entre los 18°C y 32°C (Arvelo et al, 2017).

ESTABLECIMIENTO DE CULTIVO

Fotografía 2. Frutos del cacao. Herbert Betancourt, Finca Chiquihuat.

Para el establecimiento de una plantación de cacao, un factor fundamental a analizar es el tipo de material vegetal a utilizar.
Las características que se buscan principalmente son: resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades, alta producción y buenas características organolépticas.

Adicionalmente, se debe conocer la variedad del material y este debe estar libre de plagas y enfermedades. Estos factores se garantizan cuando se adquiere plantas de un vivero certificado o manejado técnicamente.

Conocer las condiciones climáticas existentes es fundamental para establecer una parcela de cacao. Se recomienda evitar alta humedad, facilitar la ventilación y acceso a luz solar. Para esto se pueden utilizar como referencia los siguientes distanciamientos:

Planta de cacao

Tipo cuadrado



3 m distanciamiento

Tipo triángulo



3m x 4m de distanciamiento

En zonas donde no exista suficiente luminosidad el distanciamiento puede aumentar, siempre y cuando se justifique el asocio con otros cultivos. Durante el establecimiento del cultivo se debe identificar el tipo de sombra a emplearse.

En este sentido se pueden clasificar dos tipos de sombra:

Sombra temporal: Aquella empleada para proteger del exceso de luminosidad solar a las plantas de cacao en sus etapas iniciales. Dependiendo del tipo de cultivo empleado, también proveerá de un ingreso adicional al productor. Generalmente se utiliza: plátano, yuca, frijol, o cultivos de ciclo corto que no afecten al cacao.

Sombra permanente: Aquella que lo acompañará durante su etapa productiva principalmente para proteger al cacao de excesos de luminosidad solar y vientos fuertes. Este tipo de sombra genera un ambiente ideal para el cultivo de cacao, tanto por la humedad y temperatura, como por los beneficios que puede traer al suelo.

Generalmente se utilizan frutales, especies leguminosas «Inga sp.» o maderables si se busca un ingreso adicional en el largo plazo.

A continuación, se muestra un ejemplo de un asocio de cacao.

Fotografía 3. Sistema de producción de cacao asociado con una especie maderable. Raúl Quezada.

En el caso del suelo, es importante que el productor identifique el tipo de suelo con el que cuenta. Para el cacao se recomienda suelos francos y profundos, con un pH neutro (entre 6 y 7).

Otro factor clave a tomar en cuenta para el establecimiento es el tiempo que demora el ciclo del cultivo. Para el caso del cultivo de cacao, en función de su forma de producción, el tiempo desde la siembra hasta la primera cosecha comprende alrededor de 18 meses si es por injerto y más de 3 años si es por semilla.

RECOMENDACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO

1. Para conocer el estado nutricional es importante realizar un análisis de suelo en la futura plantación de cacao. Esta práctica se debe repetir anualmente para manejar adecuadamente la fertilización del cultivo.
2. Los distanciamientos empleados dependerán de las condiciones climáticas y recursos disponibles en las fincas. Normalmente se emplea el tipo cuadrado para terrenos planos y el tipo triángulo para terrenos con pendiente.
3. La sombra temporal deberá sembrarse con suficiente tiempo de anticipación para que su desarrollo no afecte al cacao y pueda protegerlo.
4. La sombra permanente debe podarse para evitar un exceso de sombra que pueda facilitar el ataque de enfermedades.
5. El distanciamiento de la sombra permanente dependerá de las condiciones climáticas, siendo más larga en zonas húmedas y más corta en zonas secas.

Una vez establecido el cultivo inician las prácticas de cultivo, que son todas aquellas actividades que realiza el productor para manejar el desarrollo adecuado del cultivo de cacao.

Una de las principales actividades que genera gasto es el control de malezas. Para su manejo se recomienda emplear machete o máquina moto guadaña, en función de los recursos y mano de obra disponible.

MANEJO DE LA FERTILIZACIÓN

El manejo de la fertilización para el cultivo de cacao tiene semejanza con el manejo de dinero en el banco. Si el propietario de la finca realiza un adecuado manejo y aporta (fertiliza) cada año, el saldo será positivo. Si por el contrario, no se realizan aportes y se extraen cada año los recursos, al final el saldo será cero.

De la misma manera, en una plantación de cacao, la planta cada año realiza una extracción de nutrientes del suelo para poder cumplir con su ciclo productivo. Si los nutrientes no se manejan adecuadamente, cada año la fertilización del suelo disminuirá o hará poco eficiente al cultivo.

El primer paso para el adecuado manejo de la fertilización en el cultivo de cacao es realizar un análisis de suelo, así se podrá conocer el estado nutricional del mismo y plantear así una fertilización adecuada. [2]

Para realizar el análisis de suelo de una parcela de cacao se debe partir de identificar la zona dentro de un croquis de la finca, así se determinará aquellas que tengan condiciones semejantes, principalmente en pendiente, tipo de cultivo y manejo. En el gráfico siguiente se muestra un ejemplo de croquis que pretende identificar el camino recorrido para tomar una submuestra de suelo y así completar una muestra de suelo.

2 Para efectos del manual se ha priorizado la fertilización edáfica (al suelo).



Ilustración 2: Ejemplo de croquis para muestreo de suelo. (Sin Retorno Studio).

Se recomienda analizar una muestra de suelo por cada tipo de cultivo del que deseamos conocer su estado nutricional.

La fertilización del suelo debe realizarse en función de los resultados del análisis y la edad del cultivo que tenemos. Debido a la variabilidad en el tipo de suelo, se recomienda que un técnico analice los resultados y determine el tipo de fertilización a aplicar.

RECOMENDACIONES PARA UNA BUENA FERTILIZACIÓN

En el caso de aplicar fertilizantes, sean químicos u orgánicos se debe:

- Cuantificar el contenido necesario para toda la parcela.
- Dividir el contenido a aplicarse por cada planta.
- Limpiar el área del suelo previo a la aplicación.
- Aplicar el fertilizante cuando el suelo esté húmedo.
- No aplicar fertilizantes de origen y contenido desconocido.
- Registrar la fecha y tiempo empleado en la aplicación (anexo 2).

El sitio a aplicar una fertilización al suelo es clave, a continuación, se muestra la zona ideal de aplicación.

Ilustración 3. Zona ideal de aplicación de fertilizante. (Sin Retorno Studio).



Ilustración 4. Zona ideal de aplicación de fertilizante en pendiente. (Sin Retorno Studio).

En terrenos con inclinación, el fertilizante se aplicará de manera perpendicular a la pendiente limpiando la zona de aplicación previa a la planta. Si se emplean fertilizantes orgánicos, estos deben haber sido adecuadamente procesados.

Se recomienda dividir la fertilización anual en función de la necesidad del cultivo, generalmente 2 a 3 veces en el año. En la siguiente tabla se propone un plan básico de nutrición para el cacao.

Tabla 1. Nutrientes extraídos por cosecha de 1000 kg de cacao por hectárea por año.

Nitrógeno	Kilogramos por hectárea (Kg/ha)			
31-40	Fósforo	Potasio	Calcio	Magnesio
	5-6	54-86	5-8	5-7

Fuente: Wessel, M. (1980).

Tabla 2. Requerimiento nutricional promedio por hectárea según etapa de desarrollo del cultivo de cacao.

Estado de la planta	Edad (meses)	Kilogramos por hectáreas (Kg/ha)						
		N	P	K	Ca	Mg	Mn	Zn
Vivero	5-12	2,4	0,6	2,4	2,3	1,1	0,04	0,01
Crecimiento	28	136	14	156	113	47	3,9	0,5
Producción	39	212	23	321	140	71	7,1	0,9
Plena producción	50-87	438	48	633	373	129	6,1	1,5

Fuente: Thong y NG (1981).

Tabla 3. Fertilización para un sistema de producción de cacao orgánico.

Edad (meses)	Gramos por planta (g/planta)			
	Nitrógeno	Fósforo P2O4	Potasio K2O	Azúfre SO4
Menos de 24	60	30	24	82
25 en adelante	80-120	50-60	50-72	200-400

Fuente: Enriquez, G. (2010).

Puede haber variaciones dependiendo del suelo y de la sombra del cultivo. El abono orgánico debe ponerse en el suelo alrededor de la planta dividiendo en 3 aplicaciones.

Toda aplicación de fertilizantes orgánicos e inorgánicos debe ser basada según el análisis de suelo de la finca.

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

El manejo integrado de plagas (MIP) combina diferentes estrategias y prácticas de manejo para cultivar y proteger cultivos sanos minimizando el uso de pesticidas. Como piedra angular de la agricultura sostenible, su objetivo es mejorar las prácticas de los agricultores para apoyar el aumento de los ingresos y, al mismo tiempo, mejorar la conservación y la gestión de los recursos naturales y la salud de las comunidades rurales y de los consumidores. El MIP hace hincapié en el crecimiento de un cultivo sano con la menor perturbación posible de los agroecosistemas y fomenta los mecanismos naturales de control de plagas (FAO y OMS, 2014).

En relación al cultivo de cacao, el MIP debe realizarse bajo el asesoramiento de un técnico, tomando en cuenta tres elementos: prevención, monitoreo e intervención.

En la **prevención** se busca evitar o disminuir la proliferación de una plaga o enfermedad en el cultivo.

El **monitoreo** permite observar y cuantificar la presencia de una plaga o enfermedad en el cultivo.

La **intervención** comprende la ejecución de prácticas para disminuir o controlar la plaga o enfermedad presente en el cultivo.

Estas prácticas generalmente tienen relación con las actividades del cultivo que se describen a continuación:

PODA

La poda es una práctica preventiva y de intervención que consiste en eliminar aquellas ramas o tejidos que reducen la productividad del cultivo de cacao.

Fotografía 4. Productora realizando poda.(ACPACI de R.L.).

La poda comprende los siguientes materiales:

- Serrucho de poda
- Tijera de poda grande (para ramas gruesas)
- Tijera de poda manual (para ramas delgadas)
- Podadoras de altura (manual o a motor)
- Pasta cúprica
- Brocha y rodillo
- Baldes plásticos

En función de su propósito se puede clasificar la poda en:

Poda fitosanitaria:

Consiste en la eliminación de tejidos o frutos enfermos.

En el caso de tejidos (ramas, hojas) se deben analizar aquellas que no perjudiquen la estructura del árbol y en la medida de lo posible reducir su impacto.

En el caso de frutos enfermos, se recomienda realizar su eliminación durante la cosecha, para evitar un gasto adicional. Los frutos enfermos deben enterrarse, cubrirse con cal o eliminarlos de la zona de la parcela.

Poda de formación:

Consiste en definir la estructura que tendrá el árbol. Esta poda se realiza de manera constante en las plantas provenientes de injerto y en las plantas provenientes de semilla, una vez se ha formado el molinillo. Generalmente se dejan 4 ramas bien posicionadas y niveladas. En esta poda se evitará sobrecargar un solo lado del árbol, pues se pueden presentar problemas con las ramas una vez se encuentre en producción.

Fotografía 5. Poda de formación

Poda de mantenimiento:

Consiste en eliminar aquellos tejidos propios del árbol que han sufrido algún daño (desgarre, rotura) o tejidos extraños, tales como plantas parásitas.

Además, en esta poda se eliminan aquellos tejidos (ramas) que no favorecen la producción de frutos o se entrecruzan con plantas vecinas.

Poda de rehabilitación:

Consiste en reactivar la actividad productiva de un árbol, disminuida o causada principalmente por el mal manejo, falta de control de enfermedades o edad avanzada. Si la poda se realiza eliminando la totalidad de ramas dejando únicamente el tallo, es una recepa; y si solo se elimina una parte considerable (3/4 de las ramas) es un descope.

RECOMENDACIONES PARA UNA BUENA PODA

Previa a la realización de cada poda en los árboles de cacao, se deben tomar en consideración los siguientes aspectos:

- **Edad:** árboles jóvenes responderán rápidamente al tipo de poda realizada, por el contrario, los de mayor edad lo harán lentamente.

- **Altura:** árboles pequeños serán de fácil manejo, control y rápida cosecha; aquellos con altura mayor a 2 metros, deberán someterse a un proceso paulatino para bajar su altura y formar su área productiva.

- **Estado fitosanitario:** si existe presencia de enfermedades en ciertos sectores de la parcela, primero se deberá bajar su incidencia para reducir los posibles daños a la totalidad de la parcela.

- **Aireación y luminosidad:** si existe asociación de cultivos, se debe analizar la cantidad de ramas y su influencia en la producción de mazorcas de cacao. Es recomendable realizar podas a los cultivos asociados y eliminarlos en el caso de afectación grave.

- **Temporalidad:** se recomienda realizar las podas cuando no haya presencia de flores ni frutos y cuando la presencia de lluvias es baja o nula.

TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

Las principales enfermedades que atacan al cultivo de cacao analizadas durante la visita a la zona de influencia del proyecto fueron: Monilia (Moniliophthora roreri E.) y Mazorca negra (Phytophthora palmivora). La primera afecta al fruto en cualquiera de sus estados de desarrollo presentándose como una mancha color café sobre la cual crece una masa blanquecina; y la segunda en cualquier parte de la planta, siendo más grave en las mazorcas dañando su calidad completamente.

Cuando la incidencia de estas plagas afecta el normal desarrollo y la productividad del cultivo, se debe considerar el uso de prácticas del cultivo o tratamientos fitosanitarios, sean químicos u orgánicos.

Fotografía 6. Fruto con síntoma externo de moniliasis. (FHIA, 2017)

Fotografía 7. Fruto con diferentes grados de infección por mazorca negra. (FHIA, 2017)

Para las dos principales enfermedades encontradas, el método más aconsejado de control es realizando podas que favorezcan el ingreso de luz solar, circulación de aire y eliminando posibles ramas o frutos enfermos. En el caso de tratamientos fitosanitarios, deben estar acompañados por un profesional o técnico acreditado en el tema, quien debe partir de una adecuada identificación del problema o plaga, para hacer la aplicación correcta.

Además, deberá prestar vital importancia a los efectos secundarios o daños que pueda causar su acción, en el personal responsable y en el ambiente.

Para combatir la monilia, se recomienda el control del cultivo. En el caso de la mazorca negra, aplicaciones de fungicida a base de cobre.

RECOMENDACIONES PARA UN ADECUADO TRATAMIENTO FITOSANITARIO

Para prevenir accidentes con el personal responsable de una aplicación, así como el adecuado control de la plaga o enfermedad y reducir los daños al medio ambiente se recomienda:

- Identificar adecuadamente la plaga o enfermedad, así no se hará un gasto en productos innecesarios.
- Capacitar al personal responsable en el uso y manejo adecuado de productos fitosanitarios.
- Dotar y velar por el buen uso de la indumentaria de protección por parte del personal responsable de las aplicaciones.
- Llevar registros de los productos y de las aplicaciones realizadas, para así determinar su eficiencia (ver anexo 2).
- Llevar registros del material de protección, para así determinar su vida útil.
- Eliminar adecuadamente los recipientes de productos fitosanitarios, se recomienda la realización de drenajes para evitar la acumulación de agua.
- Realizar mantenimiento periódico de los equipos empleados en las aplicaciones.

RIEGO

Uno de los factores a analizar para la implementación de una parcela de cultivo de cacao, es la presencia de agua, ya sea por las condiciones climáticas que permitan tener lluvias o por fuentes de agua, como ríos, pozos u otras.

La necesidad de agua en la planta de cacao está entre los 1,200 y 2,500 mm repartidos en el año. Un riego de mantenimiento para el cultivo implica al menos una lámina de 100 mm al mes. Esto dependerá principalmente de: edad de la planta, tipo de suelo, pendiente, humedad relativa y luminosidad. Las mejores zonas productivas que no necesiten riego de mantenimiento o suplementario no deberán sobrepasar los 3 meses de periodos de sequía.

Una condición de estrés por agua provocaría en el cultivo sequedad de las mazorcas, resquebrajamiento de hojas y raíces. Por el contrario, un exceso de agua o inundación provocaría daños en las raíces y facilitaría la presencia de enfermedades.

En aquellas zonas en las que el exceso de agua podría convertirse en un problema, se recomienda la realización de drenajes para evitar la acumulación de agua.

Para el cultivo de cacao, generalmente se emplean tres tipos de riego:

Gravedad: Consiste en transportar el agua hacia el cultivo inundando el suelo. Es el menos eficiente por la cantidad de agua que se emplea. No se recomienda en zonas donde existe poco acceso al agua.

Goteo: El agua se transporta en primera instancia a presión por medio de tubos hasta llegar directamente sobre la planta a través de mangueras que poseen goteros, que regulan la cantidad de agua a regar. Es el sistema más eficiente pues, si se maneja adecuadamente, emplea menor cantidad de agua.

Microarpersión: La distribución del agua se hace en primera instancia a presión por tubos y llega a las plantas a través de pequeños aspersores, que simulan el riego por lluvia.

BIBLIOGRAFÍA

ANECACAO. (2009). *Manual del cultivo de cacao para pequeños productores. Guayaquil*, Ecuador: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao de Ecuador.

Arvelo Sánchez, M., González León, D., Maroto Arce, S., Delgado López, T., & Montoya López, P. (2017). *Manual técnico del cultivo de cacao: Prácticas Latinoamericanas.* San José, CR: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Enriquez, G. (2010). Cacao Orgánico. Guía para productores ecuatorianos. Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. Quito, Ecuador.

FAO. (2004). Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): *En busca de sostenibilidad, competitividad y seguridad alimentaria*. Santiago, Chile. Conferencia Electrónica. Coordinación editorial Juan Izquierdo. Grupo de Agricultura. Oficina Regional de la FAO para América y el Caribe. Santiago de Chile.

FAO. (2004). Las Buenas Prácticas Agrícolas. Documento preparado por Ricardo Inciarte. Oficina Regional de la FAO para América y el Caribe.

FHIA (2017). Boletín Info Cacao No. 12. Julio 2017. Cortés, Honduras: Fundación Hondureña de Investigación Agrícola.

INIAP. (2019). *Ficha técnica de nutrición del cultivo de cacao*. Quito, Ecuador: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.

Suárez Capello, C., Moreira Duque, M., Vera B., J., y Vera, J. (1994). Manual No. 25, Manual del cultivo de cacao. Quevedo, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Tropical Pichilingue.

Wessel, M. (1980). *Developments in cocoa nutrition in the nineteen seventies, a review of literature.* Cocoa Growers' Bulletin.

ANEXOS

1. Registro de actividades y costos.

Fecha	Actividad Realizada	Material Empleado	Dosis	Jornales Empleados	Costo

2.Registro de aplicaciones.

Fecha	Nombre del producto aplicado	Dosis	Equipo empleado	Responsable

3.Calendario de actividades agrícolas.

	Mes											
Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

AGENCIA ITALIANA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

iila
Organización internacional ítalo-latino americana

iila

La IILA, Organización Internacional Ítalo-latinoamericana, es un Organismo intergubernamental con sede en Roma. Fue creada en 1966 con el nombre de Instituto Ítalo-Latinoamericano por el Ministro de Asuntos Exteriores Amintore Fanfani, quien concibió la IILA como una herramienta para fomentar y potenciar las relaciones entre Italia (Europa) y América Latina. Los Estados miembros que componen esta Organización son Italia y las 20 Repúblicas de América Latina (Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y República Bolivariana de Venezuela).

Desde 2017 el propósito de las numerosas actividades de la IILA es el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

AICS

La Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo es una institución gubernamental que trabaja para contribuir a erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, afirmar los derechos humanos y la dignidad de los individuos, a prevenir los conflictos y apoyar el desarrollo sostenible. Para lograr sus objetivos se basa en cuatro pilares: Personas, Planeta, Prosperidad y Paz.

«Esta publicación ha sido elaborada con la contribución de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA) y no representa necesariamente la opinión de la Agencia».

/IILAITALIA